vimar
animal health

www.vimar.com.tr

1995 yılında kurulan Vimar Hayvan Sağlığı 20 yıla yakın süredir hayvan sağlığı ve beslenmesi konularında ülkemiz hayvancılığına inovatif ürünleriyle hizmet vermektedir.

Bilgi ve tecrübesi ile kanatlı, büyükbaş ve kültür balıkçılığı sektöründe ürün portföyünü genişleterek büyümesini sürdürmektedir.

Ülkemizde lider markalardan biri olan Vimar, geniş uluslararası bayi ağı sayesinde 25 ülkeye ihracat yapan global bir şirket haline gelmiştir.

Vimar, hayvan beslenmesi ve hayvan sağlığı konularındaki bilgi birikimi, geniş ürün çeşidi, güçlü teknik kadrosu ile hayvancılık sektörüne yön vermeye devam edecektir.

RUMİNANT YEM KATKI ÜRÜNLERİ

ViMARiN LAKTO - START 4

ViMARiN LAKTO - START B+ 5

ViMARiN HEPA - SAVE B+ 6

ViMARiN LAMi - BUFF 7

TANiPRO 8

RUME-N 9

ViMARiN SAPOGUARD 10

ViMARiN PROMAR 11

ViMARiN ÖSTROViM 12

ViMARiN BOViTETRA 13

ViMASACC - 80 14

ViMASACC - 300 15

ViMARiN KURU - DÜVE 16

ViMARiN SÜT 17

ViMARiN BESi 18

ViMARiN KUZU - BUZAĞI 19

VIBOND 20

RUMİNANT YEM KATKI ÜRÜNLERİ

Vimar
animal health

[1] Vimarin LAKTO-START

Kullanım Amacı:

- Laktasyonun ilk dönemlerinde bulunan yüksek verimli süt sığırlarının günlük vitamin-mineral ihtiyaçlarını karşılamak üzere, uluslararası otoritelerin bildirdiği günlük gereksinimler göz önünde bulundurularak hazırlanmış; canlı maya, toksin bağlayıcı ve organik mineraller içeren özel bir formülasyondur.
- Yüksek verimli süt sığırlarının günlük vitamin-mineral ihtiyaçlarını dengeli bir şekilde karşılar. Metabolik aktivitelerin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesine destek olur.
- Süt verimini ve kalitesini arttırıcı etki gösterir.
- İçerdiği canlı maya ile rumen ve bağırsak mikroflorasını dengeler.
- İçerdiği iki farklı türdeki toksin bağlayıcı ile silaj ve yem ham maddelerinden gelen, hayvanlarda verim kayıplarına neden olabilecek mikotoksinleri bağlayarak performansın maksimum düzeyde tutulmasını sağlar.
- Organik çinko ve selenyumun bağırsaklardan emilim aktiviteleri yüksektir. Tırnak sağlığı, immun sistem ve üreme fonksiyonlarının desteklenmesinde rol oynarlar.

Kullanım Şekli ve Dozu:

Laktasyondaki süt sığırlarında 100 g/gün/baş şeklinde kullanılır.

İçerik	Miktar / 1 kg	
VİTAMİN A	1.000.000	IU
VİTAMİN D_3	300.000	IU
VİTAMİN E	3.000	mg
ÇİNKO	3.500	mg
ORGANİK ÇİNKO	2.000	mg
SELENYUM	30	mg
ORGANİK SELENYUM	20	mg
MANGAN	4.000	mg
KOBALT	40	mg
İYOT	75	mg
DEMİR	1.500	mg
BAKIR	1.500	mg
CANLI MAYA *(Saccharomyces cerevisiae)*	$45x10^{10}$	cfu/g
TOKSİN BAĞLAYICI	(silika) 80.000	mg
	(maya hücre duvarı) 20.000	mg
AROMA	4.000	mg

Ambalaj Şekli:
5 kg ve 25 kg'lık ambalajlarda

BAŞA DÖN

[2] Vimarin LAKTO-START B+

Kullanım Amacı:

- Laktasyonun ilk döneminde bulunan süt sığırlarının günlük vitamin-mineral ihtiyaçlarını karşılamak üzere, uluslararası otoriteler göz önünde bulundurularak hazırlanmış; mikroenkapsüle formda B grubu vitaminler, canlı maya, toksin bağlayıcı ve organik mineraller içeren özel bir formülasyondur.
- Yüksek verimli süt sığırlarının günlük vitamin-mineral ihtiyaçlarını dengeli bir şekilde karşılar. Metabolik aktivitelerin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesine destek olur.
- Süt verimini ve kalitesini arttırıcı etki gösterir.
- Korunmuş formdaki B grubu vitaminler (Biyotin, Folik Asit, Patotenik Asit, Pridoksin) enerji, yağ ve protein metabolizmalarında üstlendikleri kritik görevler ile birçok metabolik problemin meydana gelmesini önlerler.
- Korunmuş formdaki biyotin, ayak / tırnak sağlığının korunmasında görev alır.
- İçerdiği canlı maya ile rumen faaliyetlerini dengeler, asidozise karşı koruma sağlar ve yemden yararlanmayı arttırır.
- İçerdiği toksin bağlayıcı ile silaj ve yem ham maddelerinden gelen, hayvanlarda verim kayıplarına neden olabilecek mikotoksinleri bağlayarak performansın maksimum düzeyde tutulmasını sağlar.

Kullanım Şekli ve Dozu:

Laktasyondaki süt sığırlarında 100 g/gün/baş şeklinde kullanılır.

İçerik	Miktar / 1 kg	
VİTAMİN A	1.000.000	IU
VİTAMİN D_3	300.000	IU
VİTAMİN E	3.000	mg
MİKROENKAPSÜLE BİYOTİN	96	mg
MİKROENKAPSÜLE FOLİK ASİT	120	mg
MİKROENKAPSÜLE PANTOTENİK ASİT	1.200	mg
MİKROENKAPSÜLE PRİDOKSİN	750	mg
ÇİNKO	3.500	mg
ORGANİK ÇİNKO	2.000	mg
SELENYUM	30	mg
ORGANİK SELENYUM	20	mg
MANGAN	4.000	mg
KOBALT	40	mg
İYOT	75	mg
DEMİR	1.500	mg
BAKIR	1.500	mg
CANLI MAYA *(Saccharomyces cerevisiae)*	$45x10^{10}$	cfu/g
TOKSİN BAĞLAYICI	(silika) 80.000	mg
	(maya hücre duvarı) 20.000	mg
AROMA	4.000	mg

Ambalaj Şekli:
5 kg ve 25 kg'lık ambalajlarda

BAŞA DÖN

[3] Vimarin HEPA - SAVE B+

Kullanım Amacı:

- Patentli bir kaplama teknolojisi olan "Jefo Matrix Teknolojisi" ile mikroenkapsüle edilmiş B grubu vitaminlerin esansiyel aminoasitler ile bileşimi, karaciğer koruyucu etki noktasında benzersiz ve özgün bir deneyim sunmaktadır.
- Geçiş ve erken laktasyon dönemlerinde bulunan yüksek verimli süt sığırlarında negatif enerji dengesine bağlı oluşan subklinik ketozis, ketozis ve karaciğer yağlanması gibi enerji metabolizması ile ilgili sorunların önlemesi için kullanılır.
- Mikroenkapsüle formdaki B grubu vitaminler; enerji, yağ ve protein metabolizmalarında kritik görevler üstlenirler ve maksimum performans için metabolizmaya destek olurlar.
- Korunmuş formdaki lizin ve metiyonin süt verimi için sınırlandırıcı durumdaki aminoasitlerdir. Maksimum süt verimi için tamamlayıcı rol oynarlar.
- Vitamin E ve organik selenyum, hem üreme fonksiyonlarının iyileştirilmesinde hem de bağışıklık sisteminin desteklenmesinde görev alırlar.
- Doğum sonrasında negatif enerji dengesine bağlı oluşan yağ mobilizasyonunu durdurur. Kan NEFA ve BHBA düzeylerini düşürür.
- Karaciğer yağlanmasını önleyen lipoproteinlerin (VLDL) üretimini arttırır.
- Kuru madde tüketimini arttırır.
- Üreme fonksiyonlarını iyileştirir.
- Süt verimini ve kalitesini artırır.

Kullanım Şekli ve Dozu:

Geçiş dönemindeki süt sığırlarında doğumdan en az 15 gün önce başlanıp, doğumdan sonra da en az 15 gün süreyle 100 g/gün/baş şeklinde kullanılır.

İçerik	Miktar / 1 kg	
VİTAMİN A	33.000	IU
VİTAMİN D_3	9.000	IU
VİTAMİN E	3.250	mg
ORGANİK SELENYUM	30	mg
KORUNMUŞ METİYONİN	50.000	mg
KORUNMUŞ LİZİN	50.000	mg
MİKROENKAPSÜLE RİBOFLAVİN	62.5	mg
MİKROENKAPSÜLE FOLİK ASİT	37.5	mg
MİKROENKAPSÜLE KOLİN	52.250	mg
AROMA	4.000	mg

Ambalaj Şekli:
5 kg ve 25 kg'lık ambalajlarda

BAŞA DÖN

Kullanım Amacı:

- Yüksek nişasta içeren rasyonlarla beslenen ruminantların, subklinik asidozise bağlı gelişebilecek laminitis problemlerinin önlenmesinde ve mevcut sıkıntılarının giderilmesinde, rumen tamponlayıcı ve tırnak sağlığı koruyucusu olarak kullanılır.
- Canlı maya, sodyum bikarbonat ve magnezyum oksit rumen pH'ını dengeler.
- Organik / inorganik çinko ve biyotin tırnak yapısının korunması ve iyileştirilmesinde görev alır.
- Yemden yararlanmayı arttırır.
- Besi sığırlarında karkas kalitesini iyileştirir.

Kullanım Şekli ve Dozu:

Besi ve süt sığırlarda 100 gr/gün/baş şeklinde kullanılır.

İçerik	Miktar / 1 kg
CANLI MAYA *(Saccharomyces cerevisiae)*	$30x10^{10}$ cfu/g
ÇİNKO	5.000 mg
ORGANİK ÇİNKO	4.000 mg
SODYUM BİKARBONAT	700.000 mg
MAGNEZYUM OKSİT	150.000 mg
BİYOTİN	500 mg

Ambalaj Şekli:
5 kg ve 25 kg'lık ambalajlarda

BAŞA DÖN

Kullanım Amacı:

- Tanenler, yem ham maddeleri ile sağlanan ve rumende çözünme oranı yüksek olan proteinlere bağlanarak, proteinlerin rumende çözünmeden bağırsaklara geçmelerini sağlar. Böylece yemdeki proteinlerin by-pass özellikleri arttırılmış olur.
- Protein metabolizmasını destekler. Rasyondaki proteinlerin daha etkin şekilde değerlendirilmelerini sağlayarak, protein kaynaklarının rasyonda daha az kullanılabilmesine olanak sağlar. Bu etkisi ile rasyon maliyetlerini düşürür.
- Protein sindirilebilirliğine olan pozitif etkileri ile süt verimini ve besi performansını artırır.
- Mikrobiyel protein sentezini destekler.
- Rumendeki amonyak seviyesini regüle ettiği için karaciğerin amonyağı detoksifiye etmek için harcadığı enerjiden tasarruf sağlanmasına yardımcı olur.
- Süt üre nitrojeni (MUN) ve kan üre nitrojeni (BUN) değerlerinin istenilen seviyelerde kalmasını sağlar. Özellikle yüksek MUN'a bağlı mastitis problemlerinde fayda sağlar.
- Astrenjan ve bakterisid etkileri ile buzağı ishallerinde proflaktik ve tedaviye destek amaçlarıyla kullanılır.
- Rumende amonyak üretimini azaltarak doğaya saygılı bir üretime katkı sağlar.
- Organik üretim için uygundur.

Kullanım Şekli ve Dozu:

* **Sığırlarda** : 10-50 g/gün/baş
* **Buzağılarda** : 5-10 g/gün/baş şeklinde kullanılır.

* İşletmenizde kullanılan rasyona göre en uygun dozun belirlenmesi ve rasyon maliyet tasarrufu hesaplamaları için lütfen Vimar Teknik Servisi'ne başvurunuz.

İçerik:

Tatlı kestane ağacı taneni, esansiyel yağlar ve organik çinko.

Ambalaj Şekli:
5 kg ve 25 kg'lık ambalajlarda

BAŞA DÖN

[6] RÜME-N

Kullanım Amacı:

- Kaplanmış formda yavaş salınımlı bir NPN (protein yapısında olmayan azotlu bileşik) kaynağıdır. Rumende % 100 çözünebilir üre içerir.
- Tüm ruminantlarda rumene azot kaynağı sunarak mikrobiyal protein sentezini arttırır.
- Rasyon maliyetini azaltmada (protein-save) etkilidir.
- Rasyon değişikliği olmaksızın süt verimini ve besi performansını arttırır.
- Kaplanmış üre ile formüle edilen yemler rumen mikroflorasında gelişme, yem sindirimi ve sığırın performansını artırma hususunda ekonomik ve etkili bir çözümdür.
- Bağırsaklara, rumen bakterilerinin sentezlediği 2-3 kg miktarında mikrobiyal protein ulaşır. Gerekli proteinin bir kısmını bu yöntem ile üretmek ekonomik avantaj sağlar. Bu miktar, süt üretimi için gerek duyulan toplam proteinin %60 – 90'ını oluşturur.
- Rumen NH_3 düzeyi < 10 mg/dl'nin altına düştüğünde selülolitik bakteri aktivitesi durur. Selülolitik bakteriler, kaba yemlerdeki selülozu parçaladıkları için subklinik asidozis, asidozis ve düşük süt yağı sendromu gibi problemler ile direkt ilişkilidir. Bu ürün ile selülolitik bakteri aktivitesinin sürekliliği sağlanır.
- NH_3 rumen mikroflorası için zaruridir. Üre rumende NH_3'e parçalanır. Rumen bakterilerinin %82'si NH_3'ü azot kaynağı olarak kullanmaktadır.
- Yavaş salınımlı olduğu için rumen mikroflorasının dengesini bozmadan ortama sürekli istenilen düzeyde azot sunulur. Ani pH değişikliklerine neden olmaz. Kullanımı güvenlidir.

Kullanım Şekli ve Dozu:

* **Süt sığırlarında :** 50-150 gr/gün/baş
* **Besi sığırlarında :** 20-100 gr/gün/baş şeklinde kullanılır.

* İşletmenizde kullanılan rasyona göre en uygun dozun belirlenmesi için lütfen Vimar Teknik Servisi'ne başvurunuz.

İçerik	Miktar / 1 kg
ÜRE	820.000 mg/kg
PALM YAĞI	180.000 mg/kg

Ambalaj Şekli:
5 kg ve 25 kg'lık ambalajlarda

BAŞA DÖN

Kullanım Amacı:

- Ürün etken maddesi olan saponin, rumendeki protozoaları ve proteolitik bakterileri istenilen seviyede baskılar ve rumende çözünme oranı yüksek olan protein kaynaklarının by-pass özelliklerini arttırır.
- NH_3'ün daha çok selülolitik bakteriler tarafından kullanılması sağlanır.
- Selülolitik bakteriler kaba yemlerin sindiriminden sorumlu oldukları için bu bakterilerin desteklenmesi, süt yağının büyük kısmını oluşturan asetik asit üretimini arttırır.
- Rumendeki mevcut NH_3 ise saponin etkeni tarafından bağlanarak mikrobiyel protein sentezinin gerçekleşebilmesi için bakterilere zaman kazandırır.
- Rumende oluşan NH_3'ün fazlası rumino-hepatik azot döngüsü ile karaciğerde üreye çevrilerek tükürük yolu ile tekrar rumene gelir. Bu işlem karaciğer faaliyeti ve bahsi geçen döngü nedeni ile ekstra enerji gerektiren bir durumdur. Ürün ile NH_3'ün etkin kullanımı sağlandığı için enerji tasarrufu sağlanır. Özellikle sıcak stresindeki hayvanlarda enerji daha etkin kullanılmış olur.
- Rumende ekstra mikrobiyal protein üretilmesi, performansı arttırıcı etki gösterir.

Kullanım Şekli ve Dozu:

Sığırlarda 10 g/gün/ baş şeklinde kullanılır.

İçerik:

Yucca schgidera bitkisinden üretilmiştir.

Ambalaj Şekli:
5 kg ve 25 kg'lık ambalajlarda

BAŞA DÖN

Kullanım Amacı:

- Erken laktasyon dönemindeki hayvanların kuru madde tüketimi, hızla artan süt verimini henüz tam olarak karşılayacak düzeyde olmadığı için negatif enerji dengesi oluşur. Promar, içeriğinde bulunan glikoz prekürsörleri ile rumene direkt enerji kaynağı sunar ve oluşan enerji açığını minimize eder.
- Özellikle subklinik ketozis, ketozis, karaciğer yağlanması ve hipokalsemi gibi hastalıklarından korunmak için kullanılır.
- Erken laktasyon döneminde aşırı yağ mobilizasyonunu ve kondüsyon kaybını önler.
- Süt veriminde pikte kalma süresini uzatır.
- Negatif enerji dengesinin, ovaryum aktivitesi ve üreme fonksiyonları üzerine olan negatif etkilerini ortadan kaldırır.
- Geçiş döneminde kuru madde tüketimleri düşük olan ineklere, birim hacimde daha fazla enerji verme imkanı elde edilir. Kan NEFA ve BHBA düzeylerini düşürür.
- Toz formda olduğu için TMR'ye katılarak rahatlıkla kullanılabilir. Benzer etkiler için kullanılan sıvı formdaki diğer ürünlere göre daha kolay bir kullanım şansı sunar. İşçiliği azaltır.

Kullanım Şekli ve Dozu:

Süt sığırlarında doğumdan en az 1 hafta önce ve doğumdan sonra da en az 2 hafta süreyle 300 gr/gün/baş şeklinde kullanılır. Yüksek verimli hayvanlarda daha uzun süre ile kullanılmasında sakınca yoktur.

İçerik	Miktar / 1 kg
PROPİLEN GLİKOL	900.000 mg
KALSİYUM PROPİYONAT	70.000 mg
NİYASİN	500 mg
KOBALT	145 mg
VANİLYA AROMASI	500 mg
KALSİYUM KARBONAT	21.750 mg

Ambalaj Şekli:
5 kg ve 25 kg'lık ambalajlarda

BAŞA DÖN

Kullanım Amacı:

- İnfertilite problemlerinin ortadan kaldırılması ve üreme fonksiyonlarının iyileştirilmesi için özel olarak formüle edilmiştir.
- İçerikteki doğal üzüm ekstraktı (Nor-Grape Bp 20) doğal bir vitamin E kaynağıdır. Güçlü antioksidan etkisi ile üreme fonksiyonlarına destek olur.
- İz minerallerin organik formda olmaları, bağırsaklardan daha iyi emilim ile daha etkin yararlanım sağlar.
- Sıcak stresinin ovaryum aktivitesi üzerine olan olumsuz etkilerini minimize eder.

Kullanım Şekli ve Dozu:

Sığırlarda : 50 g/gün/baş

Koyun ve Keçilerde : 5 g/gün/baş şeklinde kullanılır.

İçerik	Miktar / 1 kg	
VİTAMİN A	2.000.000	IU/kg
VİTAMİN E	50.000	mg/kg
ORGANİK ÇİNKO	15.000	mg/kg
ORGANİK SELENYUM	100	mg
NOR-GRAPE BP 20	40.000	mg
AROMA	4.000	mg

Ambalaj Şekli:
5 kg ve 25 kg'lık ambalajlarda

BAŞA DÖN

Kullanım Amacı:

- Ruminantların iz mineral eksikliklerini tamamlamak ve eksikliklere bağlı oluşabilecek metabolik hastalıkları önlemek amacıyla kullanılır.
- Verim kayıplarını önler. Performansı arttırır.
- İz minerallerin organik formda olmaları, bağırsaklardan daha iyi emilim ile daha etkin yararlanım sağlar.
- Tırnak sağlığını ve immun sistemi destekler.
- İçerikteki doğal üzüm ekstraktı (Nor-Grape Bp 20) doğal bir vitamin E kaynağıdır. Güçlü antioksidan etkisi ile üreme fonksiyonlarına destek olur.
- Sıcak stresinin olumsuz etkilerini minimize eder.
- Besi sığırlarında karkas kalitesini iyileştirir.

Kullanım Şekli ve Dozu:

Besi ve süt sığırlarında : 10 g/gün/baş

Koyun ve keçilerde : 1 g/gün/baş şeklinde kullanılır.

İçerik	Miktar / 1 kg
ORGANİK ÇİNKO	40.000 mg/kg
ORGANİK MANGAN	20.000 mg/kg
ORGANİK BAKIR	12.500 mg/kg
KOBALT	1.200 mg/kg
NOR-GRAPE BP 20	25.000 mg/kg
AROMA	4.000 mg/kg

Ambalaj Şekli:
5 kg ve 25 kg'lık ambalajlarda

BAŞA DÖN

[11] Vimasacc-80

Kullanım Amacı:

- Sindirim sistemini düzenler ve yemden yararlanmayı arttırır.
- Süt verimini ve besi performansını artırır.
- Rumen ve bağırsak mikroflorasını aktivite ederek yararlı bakterilerin artışına olanak sağlar. Patojen mikroorganizma kolonizasyonlarına engel olur.
- Selülolitik rumen mikroorganizmalarının aktivitelerini arttırarak özellikle rasyondaki lifli maddelerin sindirimine katkıda bulunur. Rumende daha fazla uçucu yağ asidi üretilmesini teşvik eder.
- Laktik asidi kullanan bakteri sayısında artışa neden olur. İşkembede laktat miktarı azalır. Böylece, rumen pH'ının istenilen seviyede kalması sağlanır.
- Subklinik rumen asidozisine bağlı oluşabilecek laminitis vakalarından korur.
- Ruminal amonyak seviyesini dengeler.

Kullanım Şekli ve Dozu:

Sığırlarda : 50 g/gün/baş

Koyun ve keçilerde : 5 g/gün/baş şeklinde kullanılır.

İçerik	Miktar / 1 kg
CANLI MAYA *(Saccharomyces cerevisiae)*	$12x10^{11}$ cfu/kg
KALSİYUM KARBONAT	640.000 mg
BUĞDAY KEPEĞİ	300.000 mg

Ambalaj Şekli:
5 kg ve 25 kg'lık ambalajlarda

BAŞA DÖN

[12] Vimasacc-300

Kullanım Amacı:

- Sindirim sistemini düzenler ve yemden yararlanmayı arttırır.
- Süt verimini ve besi performansını artırır.
- Rumen ve bağırsak mikroflorasını aktivite ederek yararlı bakterilerin artışına olanak sağlar. Patojen mikroorganizma kolonizasyonlarına engel olur.
- Selülolitik rumen mikroorganizmalarının aktivitelerini arttırarak özellikle rasyondaki lifli maddelerin sindirimine katkıda bulunur. Rumende daha fazla uçucu yağ asidi üretilmesini teşvik eder.
- Laktik asidi kullanan bakteri sayısında artışa neden olur. İşkembede laktat miktarı azalır. Böylece, rumen pH'ının istenilen seviyelerde kalması sağlanır.
- Subklinik rumen asidozisine bağlı oluşabilecek laminitis vakalarından korur.
- Ruminal amonyak seviyesini dengeler.

Kullanım Şekli ve Dozu:

Ruminant yemlerine 1 kg/ton şeklinde kullanılır.

Hayvan başı kullanılmak istenirse;

Sığırlarda : 10 g/gün/baş

Koyun ve keçilerde : 1 g/gün/baş şeklinde kullanılır.

İçerik	Miktar / 1 kg
CANLI MAYA *(Saccharomyces cerevisiae)*	$45x10^{11}$ cfu/kg
KALSİYUM KARBONAT	460.000 mg
BUĞDAY KEPEĞİ	300.000 mg

Ambalaj Şekli:
5 kg ve 25 kg'lık ambalajlarda

BAŞA DÖN

Kullanım Amacı:

- Düvelerin ve kuru dönemdeki ineklerin günlük vitamin – mineral ihtiyaçlarını karşılamak, gelişimlerini desteklemek, üreme ve verim performanslarını artırmak için hazırlanmış vitamin – mineral karışımıdır.
- İçerdiği toksin bağlayıcı ile küflerle kontamine olmuş yemlerle beslenmek durumunda kalmış hayvanları, mikotoksinlerin olumsuz etkilerinden korur.
- İçerdiği aroma ile hayvanların iştahlarını açarak yem tüketimlerini teşvik eder.

Kullanım Şekli ve Dozu:

Düvelerde ve kuru dönemdeki ineklerde 50 g/gün/baş şeklinde kullanılır.

İçerik	Miktar / 1 kg
VİTAMİN A	1.200.000 IU
VİTAMİN D_3	240.000 IU
VİTAMİN E	1.500 mg
BİYOTİN	5 mg
MANGAN	8.000 mg
DEMİR	8.000 mg
ÇİNKO	8.000 mg
BAKIR	1.200 mg
KOBALT	50 mg
İYOT	100 mg
SELENYUM	10 mg
DCP (DİKALSİYUM FOSFAT)	10.000 mg
TOKSİN BAĞLAYICI	20.000 mg
ANTİOKSİDAN	1.000 mg
AROMA	1.500 mg

Ambalaj Şekli:
5 kg ve 25 kg'lık ambalajlarda

BAŞA DÖN

Kullanım Amacı:

- Süt sığırlarının günlük vitamin – mineral ihtiyaçlarını karşılamak, gelişimlerini desteklemek, üreme ve verim performanslarını artırmak için hazırlanmış vitamin – mineral karışımıdır.
- İçerdiği toksin bağlayıcı ile küflerle kontamine olmuş yemlerle beslenmek durumunda kalmış hayvanları, mikotoksinlerin olumsuz etkilerinden korur.
- İçerikte bulunan aroma, hayvanların iştahlarını açarak yem tüketimlerini teşvik eder.

Kullanım Şekli ve Dozu:

Süt sığırlarında 100 g/gün/baş

İçerik	Miktar / 1 kg	
VİTAMİN A	1.500.000	IU
VİTAMİN D_3	300.000	IU
VİTAMİN E	3.000	mg
BİYOTİN	10	mg
MANGAN	8.000	mg
DEMİR	8.000	mg
ÇİNKO	8.000	mg
BAKIR	1.000	mg
KOBALT	50	mg
İYOT	80	mg
SELENYUM	15	mg
DCP (DİKALSİYUM FOSFAT)	20.000	mg
TOKSİN BAĞLAYICI	50.000	mg
ANTİOKSİDAN	1.000	mg
AROMA	1.000	mg

Ambalaj Şekli:
5 kg ve 25 kg'lık ambalajlarda

Kullanım Amacı:

- Besi hayvanlarının günlük ihtiyaçlarını karşılamak ve performanslarını desteklemek amacıyla hazırlanmış vitamin – mineral kombinasyonudur.
- Tahıl ağırlıklı beslenen besi sığırlarında oluşabilecek vitamin – mineral eksikliklerini tamamlamak için kullanılır.
- Yemden yararlanmayı ve günlük canlı ağırlık artışını arttırır.
- İçerdiği toksin bağlayıcı ile küflerle kontamine olmuş yemlerle beslenmek durumunda kalmış hayvanları, mikotoksinlerin olumsuz etkilerinden korur.
- İçerdiği aroma ile hayvanların iştahlarını açarak yem tüketimlerini teşvik eder.
- Pika (taş-toprak yeme) ve dil döndürme gibi belirtilerin ortadan kaldırılmasında etkilidir.

Kullanım Şekli ve Dozu:

Besi sığırlarında besi süresi boyunca;

Canlı ağırlığı 350 kg'dan az olanlar için : 50 g/gün/baş

Canlı ağırlığı 350 kg'dan fazla olanlar için : 100 g/gün/baş şeklinde kullanılır.

İçerik	Miktar / 1 kg	
VİTAMİN A	1.200.000	IU
VİTAMİN D_3	300.000	IU
VİTAMİN E	2.000	mg
MANGAN	5.000	mg
DEMİR	5.000	mg
ÇİNKO	5.000	mg
BAKIR	1.000	mg
KOBALT	15	mg
İYOT	50	mg
SELENYUM	15	mg
DCP (DİKALSİYUM FOSFAT)	10.000	mg
TOKSİN BAĞLAYICI	50.000	mg
ANTİOKSİDAN	1.000	mg
AROMA	1.000	mg

Ambalaj Şekli:
5 kg ve 25 kg'lık ambalajlarda

BAŞA DÖN

Kullanım Amacı:

- Kuzu ve buzağıların günlük vitamin-mineral ihtiyaçlarını karşılamak, gelişimlerini ve immun sistemlerini desteklemek için hazırlanmış vitamin – mineral karışımıdır.
- İçerdiği aroma ile hayvanların iştahlarını açarak yem tüketimlerini teşvik eder.

Kullanım Şekli ve Dozu:

Buzağılarda : 10 g/gün/baş
Kuzu ve oğlaklarda : 5 g/gün/baş şeklinde kullanılır.

İçerik	Miktar / 1 kg	
VİTAMİN A	2.000.000	IU
VİTAMİN D_3	400.000	IU
VİTAMİN E	2.500	mg
BİYOTİN	15	mg
MANGAN	10.000	mg
DEMİR	12.000	mg
ÇİNKO	10.000	mg
BAKIR	1.500	mg
KOBALT	50	mg
İYOT	80	mg
SELENYUM	50	mg
DCP (DİKALSİYUM FOSFAT)	200.000	mg
ANTİOKSİDAN	1.000	mg
AROMA	1.000	mg

Ambalaj Şekli:
5 kg ve 25 kg'lık ambalajlarda

BAŞA DÖN

[17] VIBOND

Kullanım Amacı:

- Mikotoksikozis ve buna bağlı verim kayıplarının önlenmesi amacı ile kullanılır.
- Yemlerde ve yem ham maddelerinde oluşması muhtemel aflatoksin, T-2, zeralenon, patulin, trikotesen ve okratoksin gibi ekonomik kayıplara yol açabilecek mikotoksinlere bağlanır ve etkisiz hale getirir.
- İçeriği oluşturan saflaştırılmış silika ile yemdeki nemin kontrol altında tutulması sağlanır.

Kullanım Şekli ve Dozu:

Sığırlarda : 10 g/gün/baş
Koyun ve keçilerde : 1 g/gün/baş şeklinde kullanılır.

İçerik:

Saflaştırılmış silika içeren bir üründür.

Ambalaj Şekli:
5 kg ve 25 kg'lık ambalajlarda

BAŞA DÖN

vimar
animal health

..... / ..... / .....

vimar
animal health

..... / ..... / .....

T: +90 (216) 593 1150 pbx.
info@vimar.com.tr
export@vimar.com.tr
www.vimar.com.tr